



écophyto2018

Réduire et améliorer l'utilisation des phytos :
moins, c'est mieux

N°6 du 31 mars 2011

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale ; celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle.

MESSAGE FLASH

Tavelure

L'ensemble de la grande région est sous l'influence d'une dépression qui a engendré de nombreux passages pluvieux. Tous les secteurs sont concernés par des périodes de contaminations à risque, toujours en cours pour le moment. Le tableau ci-dessous vous résume les paramètres de ces périodes.

Zones géographiques	Début de période	Fin de période	Risque associé pour le moment	% d'ascospores projetées		Stock d'ascospores projetables pour le moment	Précipitations associées à cette période pour le moment en mm
				associées à cette période pour le moment	depuis début contaminations primaires		
Allennes les Marais (59)	30-mars	en	Léger	8,0	8,9	0,0	4,0
	17 h	cours					
Auchy les Mines (62)	30-mars	en	Léger	7,7	8,4	0,0	2,5
	16 h	cours					
Bergues (59)	30-mars	en	Assez Grave	6,5	7,1	0,0	3,5
	16 h	cours					
Hérissart (80)	29-mars	en	GRAVE	7,2	8,2	0,0	6,5
	21 h	cours					
La Capelle (02)	30-mars	en	Assez Grave	7,3	8,9	0,0	4,5
	13 h	cours					
Le Quesnoy (59)	30-mars	en	Assez Grave	8,2	10,0	0,0	6,5
	13 h	cours					
Pleine Selve (02)	30-mars	en	Léger	8,5	10,0	0,0	3,5
	18 h	cours					
Solente (02)	30-mars	en	Assez Grave	dne	dne	dne	5,5
	13 h	cours					
St Christophe à Berry (02)	29-mars	en	GRAVE	9,4	11,1	0,0	5,0
	20 h	cours					
Steenvoorde (59)	30-mars	en	Léger	3,7	7,8	0,0	7,0
	16 h	cours					
Vauvillers (80)	30-mars	en	Assez Grave	8,5	10,0	0,0	6,5
	11 h	cours					
Vron (80)	29-mars	en	GRAVE	dne	dne	dne	14,5
	19 h	cours					

Dne : donnée non évaluable (problème technique)