

Elevage laitier

Faire face au manque de fourrage cet été

La sécheresse s'est installée et a stoppé la pousse de l'herbe. L'inquiétude grandit également pour les maïs. Dans les élevages, on peut se trouver dans 3 situations : les stocks de maïs sont suffisants pour nourrir tous les animaux jusqu'à la prochaine récolte (tout va bien !), les stocks de maïs sont suffisants pour les vaches laitières, mais pas pour les autres animaux, les stocks sont insuffisants ou nuls pour les vaches laitières.

Quelles sont les pistes envisageables ?

Tout d'abord, il convient de compléter les stocks manquants par des fourrages. L'achat de coproduits humides, à condition d'en trouver. Il faut dès maintenant contacter les courtiers habituels pour connaître les disponibilités et les prix (transport compris). Attention, nous ne sommes pas les seuls sur le marché, les prix risquent de monter rapidement. L'achat de paille et de foin : « opérations fourrages », voisins, petites annonces, peut également être envisagé.

Ensuite, on peut compléter les stocks manquants par des concentrés, de la pulpe sèche ou son équivalent, des coproduits secs (correx...), des concentrés dits « paroi », concentrés spéciaux « ration sèche »... Avec pour objectif de remplacer une partie du maïs sans déconcentrer la ration. Il faut rester vigilant sur les risques d'acidose quand la proportion de concentrés dépasse les 30 %. Attention à également l'évolution des prix et ne pas attendre la dernière extrémité. Il convient également d'économiser les meilleurs fourrages, ainsi on réservera le maïs ou autres ensilages (herbe, céréales...) aux vaches laitières. Pour les génisses ou autres animaux, les rations paille + concentrés, foin + concentrés conviennent très bien.

Rations types à base de paille pour génisses laitières (kg/génisse/jour)

Age	1 à 2 ans non pleine	1 à 2 ans pleine	2 à 3 ans pleine
Paille/foin fibreux	4-5	5-6	6-7
Céréales/Pulpes sèches	2,5	4	3
T. soja	0,7	0,7	0,7

Age	1 à 2 ans non pleine	1 à 2 ans pleine	2 à 3 ans pleine
Paille/foin fibreux	4-5	5-6	6-7
corn feed/amyplus	3	4	3
cmv type 5 25 5	100 gr	100 gr	100 gr

On peut également, déconcentrer la ration en introduisant du foin ou de la paille. Suivant le stade de lactation du troupeau (vaches en état et production laitière moyenne ne dépassant pas 22 litres de lait), cette solution est parfaitement envisageable.

Et enfin, passer en ration sèche : (par exemple 10 kg de paille + 10 à 12 kg de concentrés) c'est une solution extrême qui ne peut pas s'improviser.

En conclusion, quelle décision prendre pour nourrir mes animaux laitiers ?

- 1- Reformuler ou vendre les animaux à vendre.
- 2- Pour les génisses il est préférable de passer à une ration sèche avec un concentré qui ne dépassent pas 200 €/t environ et à hauteur de 3 kg par ration maximum.
- 3- Si la ration sèche pour les génisses ne permet pas une économie suffisante de fourrages, voir pour déconcentrer la ration des vaches laitières avec de la paille ou du foin dans la mesure du possible et ensuite y ajouter de l'ensilage de blé en tout dernier recours.

Comblé un déficit fourrage a toujours un coût ; mais ne pas l'anticiper peut allonger la facture : difficultés à trouver une solution, augmentation des prix, baisse de la production laitière, répercussions sur la santé des animaux...

Simon TRAUILLÉ